



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari

Settore 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie
Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del Farmaco”

Regione Calabria
Protocollo Generale – SIAR
N. 386565 del 25/11/2020

Ai Commissari Straordinari
Ai Direttori Farmacie Territoriali
delle Aziende Sanitarie Provinciali e
delle Aziende Ospedaliere

Alle Commissioni straordinarie
Ai Direttori Farmacie Territoriali
delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Reggio
Calabria

All’Ufficio DPC Regionale

Agli MMG e ai PLS
per il tramite dei Direttori di Distretto

Agli Ordini Provinciali dei Medici

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

A Federfarma Calabria

LORO SEDI

e, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della
Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari

SEDE

Oggetto: Chiarimenti prescrizioni Eparine a basso peso molecolare per pazienti COVID-19 adulti.

Sul sito dell’Agenzia Italiana del farmaco è stata pubblicata nella sezione “*Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19*” la scheda (in allegato) relativa all’utilizzo delle eparine a basso peso molecolare (EBPM) nei pazienti adulti affetti da COVID-19.

Si ritiene, pertanto, di dover specificare quanto segue, in merito all’utilizzo sul territorio:

- le EBPM possono essere prescritte per la profilassi del tromboembolismo venoso nei pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad es. insufficienza respiratoria) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso; pertanto, per come raccomandato dalle principali linee guida, le EBPM possono essere prescritte nei pazienti adulti con COVID-19, a carico del SSN/SSR dai MMG e dagli specialisti, con RR, nei pazienti adulti affetti da malattia da COVID-19 (sia dimessi che a domicilio);

- nell'ambito delle EBPM, solo enoxaparina ha l'indicazione nella profilassi del tromboembolismo venoso dei pazienti non chirurgici; la dose raccomandata è di 40 mg (4000 UI) al giorno *sc* per almeno 6-14 giorni;
- l'enoxxaparina può essere prescritta nei pazienti COVID nella fase iniziale della malattia, quando è presente una polmonite acuta e si determina una ipomobilità del paziente, allo scopo di prevenire il tromboembolismo venoso.

Dal momento che si fa riferimento all'uso di enoxaparina a scopo profilattico, il canale di erogazione è quello della Distribuzione Per Conto.

Il prescrittore prescrive sulla ricetta dematerializzata la specialità medicinale a base del principio attivo enoxaparina, indicando, nelle apposite caselle destinate alla normativa regionale la sigla **PNEUMO**.

Il farmacista all'atto della spedizione in presenza della sigla PNEUMO, dispenserà il farmaco in DPC e all'atto dell'inserimento della ricetta dematerializzata sulla piattaforma WEBDPC, sceglierà nel menù a tendina collegato al campo "*codice aggiuntivo*", la sigla PNEUMO.

Tali ricette devono essere raccolte in una *mazzetta* separata e con numerazione dedicata.

L'Ufficio DPC Regionale, entro il 15 del mese successivo, renderà al Dipartimento Tutela della Salute, Settore 8 "Bilancio SSR, Monitoraggio sull'andamento economico delle Aziende sanitarie, Controllo di Gestione, Patrimonio", la spesa sostenuta in DPC per il mese precedente, suddivisa per Azienda Sanitaria Provinciale, per i successivi adempimenti.

Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti interessati, con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG, Specialisti).

Cordiali saluti.

f.to Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Simona Mirarchi

f.to Il Dirigente

Dott. Vincenzo Ferrari